

Japán B encephalitis

Kórokozó:	japán B encephalitis vírus (flavivíruscsalád)
Elterjedtség:	Délkelet-Ázsia, rezervoár: disznók, madarak, szarvasmarhák
Átvitel:	éjjeli aktivitású csípő szúnyogok
Lappangási idő:	4-14 nap
Jellemző tünetek:	encephalitis
Diagnózis:	immundiagnosztika, vírus kimutatása
Terápia:	tüneti kezelés
Megelőzés:	védőoltás, szúnyogok elleni védekezés éjszaka

Leishmaniasis

Kórokozó:	leishmania különböző fajtái (egysejtűek)
Átvitel:	éjjeli aktivitású csípő szúnyogok (lepkeszúnyog)

Belső szervi (viszcerális) leishmaniasis (Kala-Azar)

Elterjedtség:	trópusok, szubtrópusok
Lappangási idő:	több hónap vagy év
Jellemző tünetek:	láz, lép és máj megnagyobbodása
Diagnózis:	immundiagnosztika, kórokozó kimutatása
Terápia:	öt vegyértékű antimonvegyületek, amphotericin B, esetleg miltefosine
Megelőzés:	szúnyogok elleni védekezés éjjel-nappal

Kután (bőr-) leishmaniasis (delhi fekély)

Elterjedtség:	trópusok, Dél-Amerika, Afrika, Délkelet-Ázsia
---------------	---